




UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

# Fii responsabilă de sănătatea ta!



## Poți să previi! Testează-te la timp! Fiecare secundă contează!

PROGRAM DE PREVENȚIE, DEPISTARE PRECOCE, DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT PRECOCE AL  
CANCERULUI DE COL UTERIN Etapa II REGIUNEA „CENTRU” POCU/826/4/9/138603  
Proiect POCU/826/4/9/138603 Cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ  
TÂRGU-MUREȘ



UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ,  
FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE  
„GEORGE EMIL PALADE”  
DIN TÂRGU MUREȘ



# SCREENINGUL SALVEAZĂ VIEȚI !

## **Ce este cancerul de col uterin?**

Cancerul de col uterin se dezvoltă în colul uterin al femeii, care este intrarea în uter dinspre vagin. Aproape jumătate din cazurile de cancer de col uterin apar între 35 și 55 de ani, atunci când multe femei sunt implicate activ în viața lor profesională și familială.

## **Ce cauzează cancerul de col uterin?**

Aproape toate cazurile de cancer de col uterin sunt cauzate de **papilomavirusul uman (HPV)**. HPV este un virus foarte comun, care este de multe ori transmis în timpul actului sexual. De regulă, cancerul de col uterin este asimptomatic în stadiu incipient.

## **Ce este screeningul cancerului de col uterin?**

Este o metodă de prevenire a cancerului prin depistarea și tratarea anomaliilor în stadiu incipient care, netratate, pot evolua către cancer de col uterin. Riscul de cancer de col uterin invaziv este redus cu până la 90% la femeile care participă în mod regulat la programe organizate de screening recomandate. Cu alte cuvinte, 9 din 10 cazuri de cancer invaziv pot fi prevenite prin screening.

## **Testul Babeș-Papanicolau este dureros?**

Testul PAP sau examenul citologic cervico-vaginal constă în analiza unei probe de celule (frotiu) recoltate de pe suprafața colului uterin (cervix) și scopul lui principal este să detecteze celulele cervicale modificate (anormale) sau atipice.

## **Ce se va întâmpla în cazul unui rezultat pozitiv la screening?**

Va fi necesară efectuarea unor teste suplimentare: repetarea testului de screening și, eventual, un examen ginecologic și prelevarea unor probe de țesut. Un rezultat anormal la screening poate fi îngrijorător, dar tratamentul leziunilor precanceroase, dacă este necesar, este simplu și aproape în totalitate eficient în prevenirea cancerului de col uterin.